

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

n° 113 - 17 Mai 1978

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE des STATIONS d'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDÈCHE, DROME, ISÈRE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ABONNEMENT ANNUEL: 60 F

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Tél. (78) 62.20.30 (Postes 426 et 427)

C.C.P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région.

V I G N E

MILDIU - BOTRYTIS.-

- Dans l'ensemble des régions de la Circonscription, assurer et maintenir la protection jusqu'à nouvel ordre contre ces deux maladies simultanément à l'aide de produits polyvalents.

- Dans les régions où le BLACK-ROT est à craindre, il se trouve que les deux seuls produits efficaces à la fois contre le mildiou et le botrytis (dichlofluanide et folpel) le sont également contre le black-rot.

TORDEUSES de la GRAPPE.-

A l'exception du sud de la Circonscription et de la Savoie où des captures de papillons souvent abondantes ont été obtenues sans toutefois que les conditions climatiques ne laissent pour l'instant craindre des attaques prochaines, aucune activité importante des papillons ne s'est encore manifestée, de sorte qu'en toutes régions aucun traitement ne doit être envisagé dans les jours prochains.

ACARIENS.-

Des araignées rouges (ou jaunes) ont déjà été observées et la lenteur de croissance liée à des températures à peine normales pour la saison offre un terrain favorable à l'apparition de dégâts. En cas de pullulations bien visibles, un traitement spécifique peut s'imposer.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES - (pommier et poirier)

La protection sera maintenue en toutes régions, les cadences étant établies d'après les indications du précédent bulletin.

ANTHRACNOSE du CERISIER.-

Un second traitement avant récolte n'est à envisager qu'aux deux conditions suivantes :

- persistance de pluies suffisamment importantes au total pour entraîner le dépôt fongicide.
- cette première condition étant réalisée : éloignement suffisant de la récolte pour réaliser un traitement.

BACTERIOSE du NOYER.-

La protection doit être maintenue en toutes régions. Dans les régions les plus précoces, cet avis sera le dernier concernant cette maladie.

TORDEUSE ORIENTALE du PECHER en pépinières.-

Bien qu'on note une certaine activité du papillon dans le sud de la région (l'édition "Ardèche-Drôme" du bulletin en fait état plus largement), aucun traitement n'est encore nécessaire.

PUCERONS NOIRS sur CERISIER.-

Les premières colonies sont observées ; une intervention sera décidée dès l'apparition des premiers dégâts.

7.308

ACARIENS sur PECHER.-

On constate en de nombreux vergers d'importantes attaques de PANONYCHUS ULMI qui peuvent nécessiter une intervention spécifique.

PSYLLE du POIRIER.-

Deux cas peuvent se présenter :

- Traitement d'hiver ou traitement post-floral appliqué à la date indiquée : l'efficacité de ces traitements a été telle qu'aucune nouvelle application ne s'impose pour l'instant.
- Aucun traitement d'hiver ou de printemps. N'intervenir (fenvalérate ou amitraze) de préférence que dans la mesure où l'on peut observer des psylles, quel qu'en soit le nombre, sur ou moins 25 à 30 % des pousses.

Dans les deux cas, il sera néanmoins nécessaire de vérifier, à nouveau le niveau des populations à partir de fin Mai, au moment de l'apparition de la seconde génération des larves. Actuellement on observe des adultes issus de la première génération et la présence de Psylla Pyrisuga dont les larves provoquent l'enroulement des feuilles. Cette dernière espèce est beaucoup moins dangereuse, en effet son activité sur les poiriers est d'assez courte durée.

CEREALES

SITUATION ACTUELLE.-

- sur ORGE : sur les front des VIROSES et de la RHYNCHOSPORIOSE, situation stationnaire/ Les attaques de diverses ROUILLES restent faibles ainsi que celles de l'OIDIUM qui ont débuté plus récemment.

- sur BLE : si la SEPTORIOSE est assez répandue actuellement, le PIETIN-VERSE reste encore localisé. La menace principale est constituée par la ROUILLE JAUNE sur variétés sensibles (Chrismar notamment). Encore sporadique dans le nord de la Circonscription, elle tend à se généraliser dans le sud.

TRAITEMENTS à envisager :

- OIDIUM de l'orge dans les parcelles où il est déjà déclaré.
- ROUILLE JAUNE du blé sur variétés sensibles, et d'abord dans le sud de la région.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"Rhône-Alpes",

R. GIREAU.

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes - le Directeur-Gérant : P. JOURNET.

Inscription à la C.P.P.A.P. N° 477 AD.